

CALMIG[®] comprimé 50mg

Antimigraineux

Dans quel cas le médicament CALMIG[®] comprimé est-il prescrit ?

Ce médicament est un vasoconstricteur puissant, qui agit essentiellement sur les vaisseaux crâniens. Il appartient à la famille des triptans. Son action se manifeste environ 30 minutes après la prise du médicament.

Il est utilisé dans le traitement de la crise de migraine.

Présentations du médicament CALMIG[®] comprimé

CALMIG[®] 50 mg : comprimé ; boîte de 6

CALMIG[®] 50 mg : comprimé ; boîte de 2

Composition du médicament CALMIG[®] 50 mg : comprimé ; boîte de 6 et boîte de 2

	p cp
Sumatriptan succinate	50 mg

Contre-indications du médicament CALMIG[®] comprimé

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :


- antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral et, plus généralement, toute maladie liée à un spasme ou à un rétrécissement des artères ;
- insuffisance hépatique grave ;
- hypertension artérielle (sauf si elle est stabilisée par un traitement spécifique) ;
- en association avec un autre antimigraineux vasoconstricteur ou un IMAO.
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ce médicament ne doit pas être utilisé pour traiter des maux de tête non migraineux. Il ne convient pas non plus au traitement de certaines migraines associées à des paralysies musculaires ou oculaires.

Dans de très rares cas, une douleur dans la poitrine peut suivre la prise du médicament. Elle peut être intense et ressembler à une crise d'angine de poitrine, mais elle n'est que très rarement due à un spasme des artères coronaires. Si elle dure plus de quelques minutes, prévenez votre médecin et ne prenez pas de nouveau comprimé sans son avis.

Des précautions sont nécessaires en cas d'antécédent d'allergie aux sulfamides (risque accru de réaction allergique au sumatriptan), d'insuffisance rénale, de tabagisme, de désintoxication tabagique par la nicotine ou en présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire.

 Compte-tenu de ses effets indésirables potentiels, ce médicament peut, chez certaines personnes, ne pas être compatible avec la conduite automobile ou le maniement de machines dangereuses. Assurez-vous à l'occasion des premières prises que vous supportez bien ce médicament avant de conduire ou d'utiliser une machine.

Interactions du médicament CALMIG[®] comprimé

Ce médicament ne doit pas être associé aux autres antimigraineux de la famille des triptans, aux dérivés de l'ergot de seigle, aux IMAO : risque accru d'effets indésirables.

En cas de traitement par un dérivé de l'ergot de seigle, attendre 24 heures avant de prendre ce médicament. Après la prise de ce médicament, respecter un intervalle de 6 heures avant de prendre des dérivés de l'ergot de seigle.

Informez votre médecin si vous prenez un antidépresseur sérotoninergique ou un médicament contenant du millepertuis.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

En l'absence de données suffisantes, ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. Le risque de toxicité chez le nourrisson n'est pas connu et peut être minimisé en tirant et en jetant le lait dans les 24 heures qui suivent la prise du médicament.

Mode d'emploi et posologie du médicament CALMIG[®] comprimé

Les comprimés doivent être avalés sans être croqués avec un grand verre d'eau.

Posologie usuelle :

Comprimé :

- Adulte de plus de 18 ans et de moins de 65 ans : 1 comprimé par crise de migraine.

Il est inutile de reprendre un comprimé si l'effet a été insuffisant. En revanche, si une deuxième crise apparaît dans les 24 heures, il est possible de prendre un autre comprimé, en respectant un délai minimal de 2 heures entre les 2 prises.

Ne jamais dépasser 3 comprimés par jour.

Conseils

La prise de ce médicament ne dispense pas des mesures habituelles permettant de soulager la crise de migraine, comme s'allonger au calme dans une pièce sombre.

Effets indésirables possibles du médicament CALMIG[®] comprimé

Nausées et vomissements, qui sont également des symptômes de la crise.

Fourmillements, sensation de lourdeur ou d'oppression, bouffées de chaleur, vertiges, lassitude, somnolence.

Troubles visuels.

Augmentation transitoire de la tension artérielle, accélération ou ralentissement du cœur, palpitations.

Comme pour tous les antimigraineux, risque de maux de tête chroniques en cas d'abus du traitement.

Réaction allergique.

Exceptionnellement : spasme des artères coronaires (voir Attention), convulsions.